


甲双胍相关乳酸[中毒
、注意事项]。
乳酸酸中毒，应立即停
性支持治疗，建议立即

乳酸酸中毒的报告，包
被并仅伴有非特异性症
吸窘迫、嗜睡，严重的
型心律失常。二甲双胍
血乳酸水平升高（>5
尿或酮血症）、阴离子
症）、乳酸/丙酮酸比
常>5 μg/mL。二甲双
从而增加血液中乳酸的
尤其是高风险的患者。
乳酸酸中毒，应立即开
时立即停止服用本品。
酸酸中毒的患者，推荐
，排除蓄积的二甲双胍
酸二甲双胍可以170
经过这样的治疗通常症

中毒症状的教育，如果
用本品并就医。
二甲双胍相关乳酸酸中
降低风险和进行管理：
相关的乳酸酸中毒病例
的病人中。因为二甲双
损伤增加了二甲双胍蓄
。临床建议基于患者的

小球滤过率（eGFR）。
m^2的患者应禁止服用，
减量。
每年检测eGFR，可能有
年人），应当更频繁的

可能会增加二甲双胍相
肾功能、导致明显血流
增加二甲双胍蓄积的药

双胍相关的乳酸酸中毒
老年轻患者更可能有肝、
密切评估肾功能。
双胍治疗的患者静脉注
功能改变，发生乳酸酸中
/1.73m^2之间的患者应在
停止服用本品，有肝损
的患者给予动脉灌注碘
结束48小时后重新评估
行开始用药。
过程对食物和液体的限
血压和肾功能损伤的风

险。
组织
发足
肌
酸
过量
作
长期
肝
相关
致
室
维生
在一
7%
B_{12}
维生
素B
素B
血
指
查
在
素B
不
这
能
低血
单
但
其
酒
患
对
单
糖，
但
类
▸**【孕**
孕
对
胎，
接
哺
二
推
▸**【儿**
儿
暂
▸**【老**
由于老年患者可能出现[illegible]功能